补充题+课后题

2021年9月29日 星期三 上午7:38

常用指号

1. $\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}^n=\left[\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\right]^n$

$A^2=(2-N)A^n=I+nN+\frac{n(n-1)}{2}N^2:\cdots=I+nN.$

* $A=\begin{pmatrix}\cos\alpha&-\sin\alpha\\\sin\alpha&\cos\alpha\end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix}\cos n\alpha&-\sin n\alpha\\\sin n\alpha&\cos n\alpha\end{pmatrix}$

表示旋转角 α 的 n 次方阵

2. $\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&1&-3\\0&0&-1\end{pmatrix}^{2n\text{次}}\to\begin{pmatrix}a&2a\\0&a\end{pmatrix}$, $\alpha=(1\ 1\ -1)$.

$=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\alpha=\beta\alpha$, $\beta=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$

$A^{2n}=(\beta\alpha)\cdots(\beta\alpha)=\beta(\alpha\beta)(\alpha\beta)\cdots(\alpha\beta)\alpha=\beta(\alpha\beta)^{2n-1}\alpha$

$\alpha\beta=-1$. $A^{2n}=\beta(-1)^{2n-1}\alpha=-\beta\alpha=\begin{pmatrix}-1&-2\\-2&-4\end{pmatrix}$

3. $AB=BA$, 当 B 互异时可对角. 求可交换矩阵

(1) $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ (2) $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&5\end{pmatrix}$ (3) $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$

(1) $AB=BA$, $AB-B=BA-B$, $(A-I)B=B(A-I)$

$(A-I)B=\begin{pmatrix}0&b\\0&0\end{pmatrix}=B\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}0&a\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&b\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&ab\\0&0\end{pmatrix}$

$\forall b\neq0\Rightarrow b=0$, $\forall a\neq0\Rightarrow a=0$

(2) $A=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&5\end{pmatrix}$ $AB=\begin{pmatrix}3b_{11}&3b_{12}&3b_{13}\\3b_{21}&3b_{22}&3b_{23}\\5b_{31}&5b_{32}&5b_{33}\end{pmatrix}$

$AB=BA\Rightarrow b_{21}=b_{31}=b_{12}=b_{32}=b_{13}=b_{23}=0$.

$\Rightarrow B=\operatorname{diag}(b_{11},b_{22},b_{33})$.

(3) $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$ $AB=\begin{pmatrix}b_{31}&b_{32}&b_{33}\\b_{21}&b_{22}&b_{23}\\b_{11}&b_{12}&b_{13}\end{pmatrix}$

$AB=BA\Rightarrow b_{11}=b_{33}$, $b_{21}=b_{23}=0$

$\Rightarrow B=\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&b_{13}\\0&b_{22}&0\\b_{13}&b_{32}&b_{11}\end{pmatrix}$

4. 设 $A=(a_{ij})_{mn}$, $B=(b_{ij})_{mn}$. 则 $a_{ij}=0$.

若行列 A 中元素 $a_{ij}=a_{ji}$, 则称 A 为对称阵.

5. 若 $A=(a_{ij})_{mn}$, $B=(b_{ij})_{mn}$. 则 $b_{ij}=$

若行列 A 中元素 $a_{ij}=-a_{ji}$, 则称 A 为反对称阵.

6. 设 $A=(a_{ij})_{mn}$, $B=(b_{ij})_{mn}$. 则 $b_{ij}=$

若行列 A 中元素 $a_{ij}=a_{ji}$, 则称 A 为对称阵.

7. 设 $A=(a_{ij})_{mn}$, $B=(b_{ij})_{mn}$. 则 $b_{ij}=$

若行列 A 中元素 $a_{ij}=-a_{ji}$, 则称 A 为反对称阵.

8. 设 $A=(a_{ij})_{mn}$, $B=(b_{ij})_{mn}$. 则 $b_{ij}=$

若行列 A 中元素 $a_{ij}=a_{ji}$, 则称 A 为对称阵.

9. 设 $A=(a_{ij})_{mn}$, $B=(b_{ij})_{mn}$. 则 $b_{ij}=$

若行列 A 中元素 $a_{ij}=-a_{ji}$, 则称 A 为反对称阵.

10. 设 $A=(a_{ij})_{mn}$ 与 B 可换, 则 B 的行列式为 A 的行列式的倍数.

补充题 课.

1. $A_1\cdots A_m$ 为 n 阶上三角阵, A_i 的 $a_{ii}=0$, $\forall i=1,\cdots,m$. 证 $A_1A_2\cdots A_m=0$

A_m 上三角: $a_{ij}=0$, $i\geq j$ 时.

$A_mA_{m-1}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$

$A_1=(a_{ij})_{mn}$, 设 $a_{ij}=0$, $i\geq j$ 时. $a_{11}=0$

$A_2=(b_{ij})_{mn}$, 设 $b_{ij}=0$, $i\geq j$ 时. $b_{11}=0$

$A_1A_2=C=(c_{ij})_{mn}$, $c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$

$i\geq j$, $c_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}=0$

$i<j$, $c_{ij}=0$.

$c_{11}=\sum_{k=1}^{n}a_{1k}b_{k1}=\sum_{k=2}^{n}a_{1k}b_{k1}+a_{11}b_{11}=0$

$c_{12}=\sum_{k=1}^{n}a_{1k}b_{k2}=\sum_{k=2}^{n}a_{1k}b_{k2}+a_{11}b_{12}=0$

$D=CA_3=(d_{ij})_{mn}$, $A_1\times(a_{ij})_{mn}=D=(d_{ij})_{mn}$

$e.g.$ $\sum_{k=1}^{n}c_{1k}d_{k3}=\sum_{k=2}^{n}c_{1k}d_{k3}+c_{11}d_{13}=0+c_{11}d_{13}=0$

① $\begin{vmatrix}a_1&0&0&0\\a_1&a_2&0&0\\a_1&a_2&a_3&0\\a_1&a_2&a_3&a_4\end{vmatrix}$ ② $\begin{vmatrix}0&\cdots&0&z^1\\\vdots&&\iddots&\vdots\\n^1&\cdots&0&0\end{vmatrix}$ $=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}n!$ $=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}n!$

③ $\begin{vmatrix}a&a&&\\b&c&b&\\&a&a&\\&b&&b\end{vmatrix}$ 行列式值为0.

④ $\begin{vmatrix}a_1&0&0&0\\a_1&a_2&0&0\\a_1&a_2&a_3&0\\a_1&a_2&a_3&a_4\end{vmatrix}=a_1a_2a_3a_4$

⑤ $\begin{vmatrix}5&-4&3&1\\7&0&3&2\\0&-1&-1&4\\7&-6&0&3\end{vmatrix}$

⑥ $=-\begin{vmatrix}a_1&0&0&0\\a_1&a_2&0&0\\a_3&a_3&a_3&0\\a_4&a_4&a_4&a_4\end{vmatrix}=-a_1a_2a_3a_4$

⑦ $=5\begin{vmatrix}0&5&1&4\\0&0&-1&4\\-1&0&-1&4\\-1&0&-1&-3\end{vmatrix}+4\begin{vmatrix}7&5&1&4\\7&0&-1&4\\7&-1&-1&4\\7&-1&-1&-3\end{vmatrix}=3\begin{vmatrix}7&5&2&4\\7&0&-2&4\\7&-1&-2&4\\7&-1&-2&-3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}7&0&5&4\\7&0&0&4\\7&-1&0&4\\7&-1&-1&-3\end{vmatrix}$

$=2\begin{vmatrix}0&5&2&4\\0&0&-2&4\\-1&0&-2&4\\-1&0&-2&-3\end{vmatrix}+4\begin{vmatrix}0&5&1&4\\0&0&-1&4\\-1&0&-1&4\\-1&0&-1&-3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&5&1&4\\0&0&-1&4\\-1&0&-1&-3\\-1&0&-1&-3\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}-1&0&-1&-3\\0&0&-1&4\\-1&0&-1&4\\-1&5&1&4\end{vmatrix}=-(-5)\begin{vmatrix}-1&-1&-3\\0&-1&4\\-1&-1&4\end{vmatrix}=-5\begin{vmatrix}-1&-1&-3\\0&-1&4\\0&0&7\end{vmatrix}=-5\times(-1)\times(-1)\times7=-35$

$\begin{vmatrix}5&5&1&4\\0&0&-1&4\\-1&0&-1&4\\-1&0&-1&-3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}5&5&1&4\\0&0&-1&4\\-1&0&-1&-3\\0&0&-2&-7\end{vmatrix}=-5\begin{vmatrix}-1&-1&-3\\0&-1&4\\0&-2&-7\end{vmatrix}=-5\begin{vmatrix}-1&-1&-3\\0&-1&4\\0&0&-15\end{vmatrix}=-5\times15=-75$

$\begin{vmatrix}5&5&1&4\\0&0&-1&4\\-1&0&-1&-3\\-1&0&-1&-3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}5&5&1&4\\0&0&-1&4\\-1&0&-1&-3\\0&0&0&1\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}-1&-1&-3\\0&-1&4\\0&0&1\end{vmatrix}=-(-1)=1$

$\begin{vmatrix}5&5&1&4\\0&0&-1&4\\-1&0&-1&-3\\-1&0&-1&-3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}5&5&1&4\\0&0&-1&4\\-1&0&-1&-3\\0&0&0&0\end{vmatrix}=0$

$=2\times(-75)+35+1=-114$

⑧ $\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&n\\-1&0&3&\cdots&n\\-1&-2&0&\cdots&n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\-1&-2&-3&\cdots&0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&n\\0&2&6&\cdots&2n\\0&0&3&\cdots&2n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&n\end{vmatrix}=n!$

⑨ $\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\1&2&2&\cdots&2\\1&2&3&\cdots&3\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&2&3&\cdots&n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\0&1&1&\cdots&1\\0&1&2&\cdots&2\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&1&2&\cdots&n-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\0&1&1&\cdots&1\\0&0&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&n-2\end{vmatrix}=(n-2)!$

⑩ $\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\1&2&2&\cdots&2\\1&2&3&\cdots&3\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&2&3&\cdots&n\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\0&1&1&\cdots&1\\0&1&2&\cdots&2\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&1&2&\cdots&n-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1&\cdots&1\\0&1&1&\cdots&1\\0&0&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&n-2\end{vmatrix}=(n-2)!$

2. 证明下法正法

$\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\vdots\\\beta_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sum_{j=1}^{n}a_{1j}\beta_j\\\sum_{j=1}^{n}a_{2j}\beta_j\\\vdots\\\sum_{j=1}^{n}a_{nj}\beta_j\end{pmatrix}$

此处: β_j 合到 a_{ij} 在行列式的第 i 行 j 列处

$(\gamma_1\ \gamma_2\ \cdots\ \gamma_n)\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1n}\\b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{nn}\end{pmatrix}=\left(\sum_{j=1}^{n}b_{j1}\gamma_j\ \ \sum_{j=1}^{n}b_{j2}\gamma_j\ \cdots\ \sum_{j=1}^{n}b_{jn}\gamma_j\right)$

此处: 行列式为记到对应的第 n 列处得

3. 证明:

$\begin{vmatrix}by+az&bz+ax&bx+ay\\bx+ay&by+az&bz+ax\\bz+ax&bx+ay&by+az\end{vmatrix}=(a^3+b^3)\begin{vmatrix}x&y&z\\z&x&y\\y&z&x\end{vmatrix}$

$M=\begin{pmatrix}0&a&b\\a&0&0\\b&0&0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}0&a&b\\a&0&0\\b&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x&y&z\\z&x&y\\y&z&x\end{pmatrix}$ 对应的矩阵

$=\det\begin{pmatrix}v&a&b\\b&0&a\\a&b&0\end{pmatrix}\begin{vmatrix}x&y&z\\z&x&y\\y&z&x\end{vmatrix}$

$=\begin{vmatrix}0&a&b\\v&0&a\\a&b&0\end{vmatrix}\begin{vmatrix}x&y&z\\z&x&y\\y&z&x\end{vmatrix}$

扫描全能王 创建

2021-10-1
4 作业

10月4日作业

1. 教材 P114. 13. 14.

2. 证明下法正法

$\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{n1}&a_{n2}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta_1\\\beta_2\\\vdots\\\beta_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sum_{j=1}^{n}a_{1j}\beta_j\\\sum_{j=1}^{n}a_{2j}\beta_j\\\vdots\\\sum_{j=1}^{n}a_{nj}\beta_j\end{pmatrix}$

此处: β_j 合到 a_{ij} 在行列式的第 i 行 j 列处得

$(\gamma_1\ \gamma_2\ \cdots\ \gamma_n)\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&\cdots&b_{1n}\\b_{21}&b_{22}&\cdots&b_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\b_{n1}&b_{n2}&\cdots&b_{nn}\end{pmatrix}=\left(\sum_{j=1}^{n}b_{j1}\gamma_j\ \ \sum_{j=1}^{n}b_{j2}\gamma_j\ \cdots\ \sum_{j=1}^{n}b_{jn}\gamma_j\right)$

此处: 行列式为记到对应的第 n 列处得

3. 讨论:

$\begin{pmatrix}\lambda&1&1\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{pmatrix}$ 的秩

Prob. 37. 39. 42. 43.

扫描全能王 创建

习题

1. 证明: 数乘运算满足结合律

证明: 乘法运算满足结合律

2. $\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&&\vdots\\a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$ 对称 $\begin{pmatrix}b_{11}&\cdots&b_{1n}\\\vdots&&\vdots\\b_{n1}&\cdots&b_{nn}\end{pmatrix}$ 对称 $=\begin{pmatrix}c_{11}&\cdots&c_{1n}\\\vdots&&\vdots\\c_{n1}&\cdots&c_{nn}\end{pmatrix}$ 对称

$\forall b_{ij}=b_{ji}$, $c_{ij}=c_{ji}$

$\begin{pmatrix}a_{11}&\cdots&a_{1n}\\\vdots&&\vdots\\a_{n1}&\cdots&a_{nn}\end{pmatrix}$ 反对称 $\begin{pmatrix}b_{11}&\cdots&b_{1n}\\\vdots&&\vdots\\b_{n1}&\cdots&b_{nn}\end{pmatrix}$ 反对称 $=\begin{pmatrix}c_{11}&\cdots&c_{1n}\\\vdots&&\vdots\\c_{n1}&\cdots&c_{nn}\end{pmatrix}$ 对称

$\forall b_{ij}=-b_{ji}$, $c_{ij}=c_{ji}$

3. $AB=\begin{pmatrix}-b-a-8&-b+1-b&b+9-12\\2a+13-4b&2-b+12&-2-12+2b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-18&-11&-2\\13&11&-26\end{pmatrix}$

$BC=\begin{pmatrix}2-8+2&2+2-4\psi\\\psi+4-4\psi&\psi-1+\frac{\psi}{2}\\4+2-\frac{\psi}{2}&\psi+1+\frac{\psi}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\psi&8\\13&11\\-\frac{\psi}{2}&13\end{pmatrix}$

$|ABC|=|AB|C=\begin{pmatrix}-18&-11&-2\\3&0&11\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\\gamma&-1\\-1&-26\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-18+11+2&-18-11+26\\3+0-11&3+0+11\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5&-3\\-8&28\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-5\\8&93\end{pmatrix}$

$AC=\begin{pmatrix}1&1&-1\\\gamma&-1&-2\\-1&2&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\\gamma&-1\\-1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1+\gamma+1&-1+1-2\\\gamma-\gamma-2&-\gamma+1+4\\-1-2-6&1+2+12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-2\\-2&3-\gamma\\-9&13\end{pmatrix}$

$B^2=\begin{pmatrix}1&1&-1\\\gamma&-1&-2\\-1&2&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&-1\\\gamma&-1&-2\\-1&2&6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1+\gamma+1&1-1-2&-1-2+6\\\gamma-\gamma-2&\gamma+1+4&-\gamma-2-12\\-1-2-6&-1+2+12&1-2+36\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-2&3\\-2&3-\gamma&-\gamma-14\\-9&13&34\end{pmatrix}$

$AC=\begin{pmatrix}-1&-1&2\\1&\gamma&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1\\\gamma&-1\\-1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1-\gamma-2&1+1+4\\1+\gamma-4&-1-\gamma+8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-3-\gamma&6\\\gamma-3&7-\gamma\end{pmatrix}$

$CA=\begin{pmatrix}-1&-1&2\\1&\gamma&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&-1\\\gamma&-1\\1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1-\gamma+2&1+\gamma-4\\-1+\gamma+4&-1-\gamma-8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3-\gamma&\gamma-3\\3+\gamma&-9-\gamma\end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix}1&\gamma&\gamma^2&\cdots&\gamma^n\\1&\gamma&\gamma^2&\cdots&\gamma^n\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\1&\gamma&\gamma^2&\cdots&\gamma^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_0&b_0&c_0\\a_1&b_1&c_1\\\vdots&\vdots&\vdots\\a_n&b_n&c_n\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}a_0+\gamma a_1+\cdots+\gamma^n a_n&\cdots\\\vdots&\vdots\\a_0+\gamma a_1+\cdots+\gamma^n a_n&\cdots\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}\sum_{k=0}^{n}a_k&\cdots\\\vdots&\vdots\\\sum_{k=0}^{n}\gamma^k a_k&\cdots\end{pmatrix}$

5. 设 $A=(a_{ij})_{mn}$ 与 B 可换 n 阶方阵 B 为对角阵.

对 $\forall i\neq j$. 取 E_{ij}, 取 E_{ij}

$E_{ij}A=\begin{pmatrix}&&&\\&0&\cdots&\\&\vdots&&\\&a_{j1}&\cdots&a_{jn}\\&&&\end{pmatrix}$ $BE_{ij}=\begin{pmatrix}&&&\\&0&\cdots&\\&\vdots&&\\&b_{ii}&\cdots&\\&&&\end{pmatrix}$

$BE_{ij}=\begin{pmatrix}&&&\\&0&\cdots&\\&\vdots&&\\&b_{ii}&\cdots&\\&&&\end{pmatrix}$

$E_{ij}A=BE_{ij}\Rightarrow$ 对应项对应相等 $a_{ji}=0$.

$E_{ij}A=\begin{pmatrix}&&&\\&0&\cdots&\\&\vdots&&\\&a_{ii}&\cdots&\\&&&\end{pmatrix}$ $BE_{ij}=\begin{pmatrix}&&&\\&0&\cdots&\\&\vdots&&\\&b_{ii}&\cdots&\\&&&\end{pmatrix}$

$a_{ii}=b_{ii}$, 即 A 的对角元素为 B 的对角元素.

$A=(a_{ij})_{mn}$ $B=(b_{ij})_{mn}$

$AB=\left(\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}\right)_{mn}$ $(AB)_{ij}=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}$

6. $(A_1A_2)^{-1}=(A_2^{-1}A_1^{-1})^{-1}=A_2^{-1}A_1^{-1}$

$(A_1A_2A_3)^{-1}=(A_3^{-1}A_2^{-1})^{-1}A_1^{-1}=A_3^{-1}A_2^{-1}A_1^{-1}$

$(A_1A_2\cdots A_n)^{-1}=A_n^{-1}\cdots A_2^{-1}A_1^{-1}$

$(A_1A_2\cdots A_n)^{-1}=A_n^{-1}\cdots A_2^{-1}A_1^{-1}$

7. $\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}\cos^2\theta-\sin^2\theta&2\sin\theta\cos\theta\\-2\sin\theta\cos\theta&\cos^2\theta-\sin^2\theta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos2\theta&\sin2\theta\\-\sin2\theta&\cos2\theta\end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\-\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}^k=\begin{pmatrix}\cos k\theta&\sin k\theta\\-\sin k\theta&\cos k\theta\end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix}a&b\\-b&a\end{pmatrix}^k=\begin{pmatrix}a&b\\-b&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a&b\\-b&a\end{pmatrix}\cdots\begin{pmatrix}a&b\\-b&a\end{pmatrix}$ $(a^2+b^2)^{\frac{k}{2}}\begin{pmatrix}\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}&\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\\-\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}&\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\end{pmatrix}^k$

$a=0$ 时, $\begin{pmatrix}0&b\\-b&0\end{pmatrix}^k=\begin{pmatrix}0&b^k\\-b^k&0\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}\cos k\theta&\sin k\theta\\-\sin k\theta&\cos k\theta\end{pmatrix}$

$a\neq0$ 时, $\begin{pmatrix}a&b\\-b&a\end{pmatrix}^k=(a^2+b^2)^{\frac{k}{2}}\begin{pmatrix}\cos k\theta&\sin k\theta\\-\sin k\theta&\cos k\theta\end{pmatrix}$

$